



## VITICULTURE

## Hors-série – Bilan de campagne 2014

### SOMMAIRE

Oïdium  
Mildiou  
Pourriture acide  
Maladie du bois  
Cicadelle des grillures  
Vers de la grappe  
Acariens  
phytophages

**ANIMATEUR FILIERE :** CRVI  
**Rédacteur :** G Salva

**Structures partenaires :**  
CA2B, UVB, domaine  
Casabianca, domaine Comte  
Peraldi, domaine  
Montemagni, Clos Landry,  
Clos d'Orléa, Terra Vecchia,  
Clos Capitoro

**Directeur de publication :**  
Joseph COLOMBANI  
Président de la Chambre  
d'Agriculture de Corse  
15 Avenue Jean Zuccarelli  
20200 BASTIA  
Tel : 04 95 32 84 40  
Fax : 04 95 32 84 43  
<http://www.cra-corse.fr/>

**Crédit photo :** CRVI de Corse



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ÉCOPHYTO.

### • OÏDIUM

Les symptômes d'oïdium ont été fréquents sur différents cépages, mais les niveaux de pression ont été variables selon les régions viticoles. Le champignon a globalement progressé sur l'ensemble de la Corse à partir de mi-juin, mais il a été plutôt bien maîtrisé. Quelques foyers virulents ont persisté jusqu'à l'éclatement des baies.

### • MILDIOU

Malgré un début de printemps favorable au développement du champignon, la situation a été relativement saine en 2014. Quelques cas ont parfois été préoccupants en Côte orientale et sur la région d'Ajaccio. Les divers épisodes pluvieux du mois de juillet ont engendré des contaminations secondaires (repiquages), qui ont donné lieu à du Mildiou mosaïque sur feuille.

### • POURRITURE ACIDE

En fin de saison (août/septembre), des foyers de Pourriture acide ont été signalés dans plusieurs zones viticoles. L'éclatement des baies dues à l'Oïdium ont été à l'origine d'une partie des contaminations. Les drosophiles et les cochenilles farineuses, habituellement peu présentes jusqu'alors, ont été aussi des vecteurs de la Pourriture.

### • MALADIE DU BOIS

Aucun secteur n'a été épargné par les différentes maladies du bois. Les symptômes d'Esca et BDA sont toujours en progression dans le vignoble corse.

### • CICADELLE DES GRILLURES

Les niveaux d'attaque en 2014 ont été variables dans le vignoble. Les dégâts ont parfois été importants, notamment dans la région d'Ajaccio et sur la Côte Orientale, qui semblent être les plus concernées par la présence d'*Empoasca vitis* (Cicadelle verte). A surveiller.

- **VERS DE LA GRAPPE**

Les larves de première et deuxième générations n'ont occasionné aucun dégât. En revanche, en fin de saison, la troisième génération a été plus problématique et les dégâts parfois importants. Des attaques tardives ont été signalées, par exemple dans la région d'Ajaccio où ces ravageurs sont habituellement peu présents.

- **ACARIENS PHYTOPHAGES**

Depuis quelques années (en particulier au printemps), on note de plus en plus la présence d'acariens jaunes (*Eotetranychus carpini*) dans le vignoble corse. En 2014, les attaques ont été essentiellement observées sur la Côte Orientale, mais sans gravité apparente.